

Vanddrivende behandling (Tiazider, Loop-diuretika)

Afdeling for Hjertesygdomme

Til patienter og pårørende

Anvendelse

Tiazid (Centyl)

- Anvendes ved lettere grader af væskeophobning (som kan opstå i forbindelse med nedsat hjertepumpefunktion)
- Behandling af forhøjet blodtryk - der kan gå op til 14 dage før virkningen er optimal

Loop-diuretika (Furosemid/Bumetamid)

- Anvendes ved mere udtalte væskeophobninger og virker hurtigt og kraftigt. Effekt efter 1/2-1 time efter indtagelse. Virkningen varer 4-6 timer. Findes også som depottablet

Virkning

Øger udskillelsen af salte og vand

Mulige bivirkninger

- Forstyrrelser i kroppens saltbalance (ses i blodprøve)
- Svimmelhed
- Appetitløshed
- Kvalme
- Mundtørhed
- Ændret smagssans

Gode råd

- Drik 1 1/2 liter vand dagligt
- Brug vejning som kontrol ift væsketab
- Tag kun kaliumtilskud efter aftale med lægen
- Hvis effekten af den vanddrivende medicin giver problemer i hverdagen, så tal med lægen
- Tag ikke smertestillende medicin, der indeholder Ibuprofen (det nedsætter effekten af loop-diuretika)
- Få undersøgt blodets indhold af kalium regelmæssigt
- HUSK BLODPRØVEKONTROL