

Analysenavn	Plv(spec.)—Leukocytter(mononukl.); antalk.
Kortnavn	Leukocytter (mononukl.);Plv
Synonym	-
Forkortelse	MONO-PLV
IUPAC kode	NPU18215
Kvantitetsnummer	002362
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt
Prøvemateriale	3 mL pleuravæske i LILLA(K3) 3 ; glasset vendes 5-10 gange. Undersøgelsen for celler bør foregå hurtigst muligt. Holdbarheden er 1 - 2 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Se ovenstående.
Referenceinterval	Større end $100 \times 10^6/L$
Analyseusikkerhed	6 %
Unormale værdier	Et forhøjet leukocytaltal med overvægt af polynukleære leukocytter er karakteristisk for akutte inflammationer i eller nær pleura f.eks. pneumoni, lungeinfarkt og pancreatitis. Øget lymfocytfraktion ses ved TB, autoimmune og rheumatiske pleuritter, uræmi, lymfom, subakut inflammation og chylothorax (uklar ofte mælket væske med mere end 2 gange P-Triglycerid koncentrationen). Pleuravæsker udgør normalt ca. 5-10 mL klar bleggul viskøs væske uden tilstrækkelig fibrinogen til at koagulere.

Seneste opdatering 23.07.13