

<b>Analysenavn</b>	P—Homocystein; stofk.
<b>Kortnavn</b>	Homocystein;P
<b>Synonym</b>	HCY, HOMOT
<b>Forkortelse</b>	HOMOCYS
<b>IUPAC - kode</b>	NPU04073
<b>Kvantitetsnummer</b>	000885
<b>Instruktion for rekvirent</b>	Anvendes i forbindelse med tromboseudredning eller efter aftale med Klinisk Kemisk Afdeling, Sønderborg.
<b>Prøvemateriale</b>	1 mL plasma Holdbarheden er 72 timer ved stuetemperatur.
<b>Prøvetagning</b>	Blodet tages i <a href="#">LGRØN 4.5</a> , som straks vendes 10 gange. <b>Senest 1 time</b> efter blodprøvetagning centrifugeres blodet ved 2000 g i 10 minutter.
<b>Referenceinterval</b>	4,5 - 12,0 µmol/L
<b>Analyseusikkerhed</b>	6 %
<b>Unormale værdier</b>	Forhøjede værdier ses ved B12, Folat og Pyridoxin(B6) mangel og ved arvelig hyperhomocysteinæmi. Let forhøjede værdier ses ved en del medicinske tilstande samt ved behandling med methotrexat og visse antiepileptika.

Seneste opdatering 23.07.13