

Analysenavn	P—Prostata­specifikt antigen; massek.
Kortnavn	Prostata­specifikt antigen;P
Synonym	-
Forkortelse	PSA
IUPAC kode	NPU08669
Kvantitetsnummer	001586
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt
Prøvemateriale	1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i LGrøn 4,5 .
Referenceinterval	\geq 0 år - < 60 år mindre end 3,0 µg/L \geq 60 år - < 70 år mindre end 4,0 µg/L \geq 70 år mindre end 5,0 µg/L
Analyseusikkerhed	8 %
Unormale værdier	<p>PSA er et enzym, der produceres helt overvejende i prostatas epithelceller, og er en vigtig markør for prostata adenocarcinom. Nogle få procent af adenocarcinomerne er så cellulært umodne, at de ikke producerer PSA. Ca. 1/3 af patienterne med prostatahypertrofi har forhøjet PSA. Prostatitis, urinretention, prostata­manipulation, og biopsi giver alle øgede PSA værdier. Prostata cancerbehandling følges med PSA målinger. PSA er ikke egnet som generel screeningsmarkør for prostatacancer.</p>

Seneste opdatering 14.05.15