

Kære kolleger

Behandlingsmuligheder for provokeret abort op til 12+0 uger

Sygehus Sønderjylland – Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

Vi tilbyder tre forskellige behandlingsmuligheder for kvinder, som ønsker en provokeret abort inden udgangen af graviditetsuge 12+0.

Tilbud og behandling tilpasses individuelt, ud fra den gravides ønsker og de kliniske forudsætninger.

1. Medicinsk abort uden vaginal skanning - GA 12+0

Beskrivelse

Kvinder med sikker graviditetsalder baseret på menstruationsoplysninger kan tilbydes medicinsk abort uden behov for vaginal ultralyd.

Udvælgelse

Patienten vurderes ved hjælp af en algoritme, som sikrer:

- Kendt første dag i sidste menstruation
- Ingen symptomer på ektopisk graviditet (fx ensidig mavesmerte,)
- Fravær af risikofaktorer (tidligere ektopisk graviditet, IUD in situ, uklar graviditetshistorik mv.)

Fordele

- Hurtigere adgang til behandling
- Mindre invasiv udredning
- Ressourcebesparende for både patient og system

2. Very Early Medical Abortion (VEMA) – GA < 6+0

Beskrivelse

Ved gestationsalder under 6 uger kan medicinsk abort påbegyndes, **selv om intrauterin graviditet endnu ikke kan visualiseres på vaginal ultralyd.**

Der kan være enten:

- Ingen synlige graviditetstegn på skanningen, eller
- En lille gestationssæk uden fostervæv

Krav

- Forventet gestationsalder < 6+0 baseret på menstruation
- Ingen kliniske tegn på ektopisk graviditet

- Informeret samtykke: patienten skal forstå og acceptere, at graviditetens placering ikke er bekræftet
- Opfølgning med HCG-målinger

Fordele

- Tidlig behandling uden ventetid
 - Undgå unødige forsinkelser pga. skanningsusikkerhed
-

3. Kirurgisk abort i lokalbedøvelse-GA 12+0

Målgruppe

- Kvinder, som ønsker at undgå generel anæstesi
- Kvinder med medicinske kontraindikationer mod GA
- Kvinder, som ønsker hurtig og ambulant behandling

Fordele

- Høj patienttilfredshed og god oplevelse
 - Behandlingen foregår ambulant
 - Gennemsnitlig VAS (visuel analog skala for smerte) er lav: ca. 4
 - Reduceret behov for operation og generel bedøvelse
-